

SOMMAIRE

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN

Situation

Rédaction :
FREDON Bretagne - 02 23 21 18 18



FREDON Bretagne
ZA Bellevue

5 rue Antoine de Saint-Exupéry
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 23 21 18 18
Fax 02 99 27 56 89
www.fredon-bretagne.com
fredon@fredon-bretagne.com




CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : LES PREMIÈRES CHENILLES AU SOL



Le cycle biologique classique de la chenille processionnaire du pin en climat océanique évoque une descente de la cime des arbres à la sortie de l'hiver.

Depuis quelques années, la chenille processionnaire du pin a désynchronisé son cycle théorique : une partie des descentes a lieu à l'automne. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène (*dérèglement climatique, adaptation du cycle biologique en limite Nord de son aire de répartition...*), mais ce que l'on peut affirmer c'est que la chenille processionnaire du pin doit y trouver un intérêt pour la survie

de l'espèce. En décalant la date de sortie du nid, cela décale également la date d'émergence des papillons et donc les conditions lors de l'accouplement et de la ponte : statistiquement le nombre de périodes météorologiques favorables seront plus nombreuses. C'est pour cela que les trois dernières années ont connu une période de descente des chenilles processionnaires plus longue engendrant un risque sanitaire sur près de six mois de l'année.



Cycle de vie des chenilles processionnaires. Source : Lorient.fr

L'automne 2016 n'a pas connu de phénomène de descente massive comme les années précédentes. En ce mois de mars 2017, on se retrouve donc dans un cas de figure classique vis-à-vis du cycle biologique, cela veut aussi dire que les nids de chenilles observés dans les pins sont encore occupés. **Il est possible que le nombre de descente soit supérieur à ce qui a eu lieu les années passées au cours des semaines à venir.**

En février, on a observé seulement **quelques chenilles processionnaires au sol et de manière très localisée**, notamment sur la côte. **En cette seconde moitié du mois de mars, les descentes de chenilles se multiplient et les observations sont fréquentes surtout en Bretagne Sud.** La vigilance est de mise : de nombreuses chenilles processionnaires devraient être visibles au sol ces prochains jours.